



ТАКТИКА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТКИ С ПРЕДИАБЕТОМ: ПАМЯТКА ДЛЯ ВРАЧА¹



- Если пациентка уже пыталась изменить свой образ жизни (диета, спорт) в течение полугода и ей не удалось снизить массу тела на 5-7% от исходной, то в данном случае рассматривается назначение медикаментозной терапии.
- Необходимо предупредить пациентку о необходимости повторной консультации у врача через полгода для измерения глюкозы плазмы натощак.



Рекомендованная суточная доза при предиабете составляет 1000-1500 мг/сутки¹.*

Удобная схема приема²

1 таблетка 750 мг однократно вечером во время ужина в течение двух недель

2 таблетки 750 мг однократно вечером во время ужина на постоянной основе

Благоприятный профиль безопасности, подтвержденный 15-летним наблюдением³

1. Диагностика, лечение и диспансерное наблюдение пациентов с предиабетом в условиях первичной медико-санитарной помощи. Шестакова М.В., Драпкина О.М., Бакулин И.Г. и др. - Издание – М.: ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, 2021 г., 40 с.
2. Согласно инструкции начальная доза Глюкофаж® Лонг составляет 500-750 мг.
3. Aroda VR, Knowler WC, Crandall JP, et al. Metformin for diabetes prevention: insights gained from the Diabetes Prevention Program/Diabetes Prevention Program Outcomes Study. *Diabetologia* / 2017;60(9):1601-1611. doi:10.1007/s00125-017-4361-9. 1



MERCK

ООО «Мерк», 115054, г. Москва, ул. Валуева, д. 35.
Тел.: +7 495 937 33 04; факс: +7 495 937 33 05
Материал предназначен для специалистов здравоохранения
RU-NOND-00024

ПРЕДИАБЕТ
ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ